

AURORA BIOFARMA s.r.l.

Via S. Rocco, 127 - Loc. Gio. Paolo II - 21131 Milano

Tel. 02 882921.1 - Fax 02 8906228

C.F. 0207990015 - C.I. 0207990015

PIROMAL®

Indicato per la prevenzione e il trattamento dell'iperacidità gastrica, anche in caso di sintomi persistenti, del reflusso gastroesofageo e laringofaringeo, e per la protezione della mucosa.

Indicato per la prevenzione e il trattamento dell'iperacidità gastrica, anche in caso di sintomi persistenti, del reflusso gastroesofageo e laringofaringeo, e per la protezione della mucosa.

1. Identificazione, composizione e indicazione d'uso del DM

1.1 Meccanismo d'azione

L'alginato è un polisaccaride isolato da alghe. Questa fibra, quando raggiunge lo stomaco, dà luogo molto rapidamente alla formazione di un gel viscoso e leggero, che copre e protegge la mucosa gastrica.

Il gel viscoso di alginato, rende anche più difficili i movimenti di salita del contenuto gastrico, riducendo il numero di episodi di reflusso.

L'associazione carbonato+bicarbonato neutralizza l'acidità di stomaco. La quantità di sali presenti nella formulazione permette di alleviare l'iperacidità gastrica anche in caso di sintomi persistenti. Inoltre, le bolle di anidride carbonica che si formano nella reazione, vengono intrappolate dal gel di alginato, che viene convertito in una schiuma che galleggia sopra la superficie dei succhi gastrici. Quando si verifica reflusso, la schiuma che entra nell'esofago è costituita principalmente da alginato, e protegge fisicamente la mucosa da danni provocati dal contatto con gli acidi e gli enzimi digestivi. La schiuma resiste nello stomaco per un tempo

sufficiente a garantire il termine della digestione gastrica e quindi far passare il bolo nell'intestino. Inoltre le proprietà mucoadesive dei semi di tamarindo sono utili per promuovere effetti protettivi gastrici.

1.2 Componenti

Ogni stick pack contiene:

Alginato di sodio, carbonato di calcio, bicarbonato di potassio, estratto di semi di Tamarindus indica
Eccipienti: Estratto di zenzero (aroma), Zenzero olio essenziale (aroma), aromi di anice e latte, acqua, Carbomer, nipagina sodica, sucralosio.

2. Confezione

Una confezione contiene 20 stick pack da 15,0 g l'uno

3. Dosaggio e modalità d'uso

Adulti e adolescenti (12-18 anni)

La posologia consigliata è di tre stick pack al giorno, da assumere immediatamente dopo i due pasti principali e uno prima di coricarsi, per almeno due settimane, fino alla risoluzione dei sintomi. Se i sintomi persistono dopo un mese di assunzione del prodotto, consultare il medico. Agitare bene lo stick pack prima dell'uso.

4. Effetti collaterali

Alle dosi necessarie per ottenere l'effetto

terapeutico, non è nota l'insorgenza di effetti collaterali, salvo casi di intolleranza individuale, che potrebbero causare un leggero e transitorio senso di nausea o costipazione.

Se i sintomi persistono, consultare il medico.

5. Interazioni con integratori alimentari e farmaci

A causa della sua natura viscosa, il dispositivo medico può ritardare o ridurre l'assorbimento dei farmaci somministrati contemporaneamente. Quindi, consultare un medico prima di usare un prodotto come PIROMAL®, soprattutto quando si utilizza la pillola anticoncezionale o farmaci salvavita.

6. Conservazione

Tenere le PIROMAL® in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore o dalla luce diretta: aprire la bustina appena prima dell'utilizzo. Non usare in caso di confezione danneggiata. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Conservare il dispositivo tra i 15°C e i 25 °C.

7. Avvertenze e precauzioni

Negli adolescenti (12-18 anni) usare il prodotto solo se strettamente necessario e sotto controllo medico. Non utilizzare il prodotto al di sotto dei 12 anni. Sebbene non vi siano rischi noti, in stato di gravidanza o in allattamento si consiglia di consultare il medico prima di utilizzare il prodotto. Non superare la dose consigliata come quantità maggiori può causare l'insorgenza transitoria di stipsi o diarrea. Il prodotto è controindicato nei casi di stipsi cronica o diarrea, malattie renali, o insufficienza cardiaca cronica.

Non utilizzare PIROMAL® per più di 30 giorni consecutivi, se i sintomi persistono consultare il

medico. Non prendere in caso di intolleranza al prodotto. Non prendere in caso di ipersensibilità nota ai componenti.

8. Data di scadenza

Non assumere dopo la data di scadenza stampata sulla confezione. La data di scadenza si riferisce al prodotto conservato in confezione integra.

9. Smaltimento

Il dispositivo scaduto o comunque da eliminare deve essere gestito come da regolamento di gestione dei rifiuti dell'Ente Gestore Locale.

Non disperdere in nessun caso il prodotto o la sua confezione nell'ambiente.

Data ultima revisione: Maggio, 2021



La Tua opinione è importante!
Al fine di valutare la Tua soddisfazione per il prodotto, dedica 5 minuti per compilare il breve questionario che trovi al seguente indirizzo o scansando questo QR code.
<https://www.siiit-pms.com/piromal>

SIIT srl

Via Ariosto 50/60

20090 Trezzano sul Naviglio (MI) - ITALY

AURORA
biofarma

Distributore:

Aurora Biofarma S.r.l.

Via Porpora, 127

20131 Milano (MI) - ITALY

URV 062021



03010580/1



Nome prodotto:

PIROMAL

Cod. Componente Siit:

03010580/1

Formato aperto:

140x170 mm

Formato chiuso:

35x170 mm

Colori in bianca:

2 colori: Pantoni 7545 + 1945



P7545



P1945

Colori in volta:

1 colore: Pantone 7545



P7545